

Karta przypominająca

Karta ta zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które powinni Państwo wiedzieć przed rozpoczęciem, a także w trakcie leczenia choroby nowotworowej lekiem denosumab (XGEVA[®]) w postaci wstrzyknięć.

Lekarz zalecił, aby otrzymali Państwo lek denosumab (XGEVA[®]) w postaci wstrzyknięć w celu zapobiegania powikłaniom kostnym (np. złamania) spowodowane przerzutami guzów litych do kości lub rakiem kości.

Działanie niepożądane zwane martwicą kości szczęki (uszkodzenie kości szczęki) było zgłaszane często (może dotyczyć od 1/100 do 1/10 pacjentów) u pacjentów z chorobą nowotworową otrzymujących lek denosumab (XGEVA[®]) w postaci wstrzyknięć. ONJ może również wystąpić po zakończeniu leczenia.

Ważne jest podjęcie działań zapobiegających rozwojowi martwicy kości szczęki, ponieważ może być ona dolegliwością bolesną i trudną do wyleczenia. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia martwicy kości szczęki, należy zastosować odpowiednie środki ostrożności.

Przed rozpoczęciem leczenia

- Proszę sprawdzić z lekarzem czy zalecane jest przeprowadzenie badania stomatologicznego przed rozpoczęciem leczenia lekiem denosumab (XGEVA[®]).
- Proszę powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce (pracownikowi ochrony zdrowia), jeśli występują jakiegokolwiek problemy z jamą ustną lub zębami.

U pacjentów, u których planowane jest wykonanie zabiegu stomatologicznego (np. usunięcie zęba), u których nie są wykonywane rutynowe badania stomatologiczne albo występują choroby dziąseł, u palaczy, oraz u pacjentów poddanych różnym terapiom przeciwnowotworowym, ryzyko rozwoju martwicy kości szczęki może być większe.

W trakcie leczenia

- Proszę utrzymywać prawidłową higienę jamy ustnej i rutynowo poddawać się przeglądom stomatologicznym. Jeśli używają Państwo protez dentystycznych, proszę upewnić się, że są one właściwie dopasowane.
- Jeśli są Państwo w trakcie leczenia stomatologicznego lub planują Państwo zabieg stomatologiczny (np. usunięcie zęba), proszę poinformować o tym lekarza oraz powiedzieć swojemu stomatologowi o stosowaniu leku denosumab (XGEVA[®]).
- Proszę niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i stomatologiem, jeśli mają Państwo jakiegokolwiek problemy w obrębie jamy ustnej lub problemy z uzębieniem takie, jak ruszanie się zębów, ból lub obrzęk albo niezagojone owrzodzenia lub zmiany sączące, ponieważ mogą to być oznaki martwicy kości szczęki.

Proszę zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.